

ทำความเข้าใจกับ Hereditary Angioedema (HAE)

knowHAE
awareness, answers, action

ดูสัญญาณและอาการอย่างละเอียด

คนที่ เป็น HAE จะมีอาการบวมและปวดอย่างฉับพลัน ซึ่งจะเกิดขึ้นที่ส่วนใดของร่างกายก็ได้ อาการของ HAE จะแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละคน และสามารถมีอาการที่หลากหลายได้

ไม่ว่าคุณหรือใครก็ตามที่เป็นโรค HAE ล้วนต้องเจอกับอาการของโรคที่ยากจะคาดเดา อย่างไรก็ตาม ยิ่งคุณรู้จักโรคนี้มากขึ้นเท่าใด คุณก็จะสามารถบริหารจัดการได้มากขึ้นเท่านั้น

คอ

อาการบวมที่คอ หรือเป็นทึ่กล่องเสียง
โอกาสจะเกิดขึ้นได้น้อยกว่าจุดอื่น
แต่อาการบริเวณคอถือว่ารุนแรงที่สุด

อาการบวมที่คออาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
เนื่องจากอาจทำให้หายใจไม่ออก
ถ้าหากคุณมีอาการดังกล่าว
นั่นคือภาวะฉุกเฉินที่ต้องรีบ
เข้ารับการรักษาโดยทันที

ช่องท้อง

ถ้าเกิด HAE ที่ช่องท้อง อาจมีอาการ
ปวดท้องเล็กน้อยจนถึงขั้นรุนแรง
ทั้งนี้รวมถึงการอาเจียน และหรือท้องเสียได้

การเกิดอาการที่ช่องท้อง
อาจจะไม่ได้เกิดร่วมกับอาการบวมก็ได้

ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น HAE
อาการปวดท้องอาจทำให้เกิดความสับสน
ในทางการแพทย์ และนำไปสู่การผ่าตัดโดยไม่จำเป็น

ใบหน้า

บริเวณอื่นๆ


อาการบวมที่ใบหน้า มือ เท้า และอวัยวะ
เพศ เป็นการเกิดขึ้นทางผิวหนัง (หรือเกิด
ใต้ผิวหนัง) อาการบวมบริเวณใต้ผิวหนัง
มักเกิดขึ้นพร้อมกับผื่นแดงแต่ไม่มี
อาการคัน

อาการที่เกิดขึ้นแบบนี้ มักจะได้รับการ
วินิจฉัยผิดเป็นประจำ ว่าเป็นอาการแพ้
แต่จะไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วย
ยาแก้แพ้ เช่น แอนติฮิสตามีน
(antihistamines) กลูโคคอร์ติคอยด์
(glucocorticoids) และ
เอพิเนฟริน (epinephrine)

อวัยวะเพศ

มือ

เท้า



ทราบไหมว่าคุณเป็น HAE ชนิดไหน

knowHAE
awareness, answers, action

HAE มีมากกว่า 1 ชนิด

แท้ที่จริงมีหลายชนิด ในขณะที่มีสัญญาณและอาการของโรค คล้ายคลึงกัน และชนิดที่คุณเป็น วิธีการรักษาอาจต่างกันก็ได้

HAE มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม

มีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมต่างๆ ถึง 450 ชนิดที่เกี่ยวข้องกับ HAE ซึ่งถ้าพบความผิดปกติแม้เพียง ชนิดเดียวก็สามารถทำให้เกิดโรคนี้ได้

ส่วนใหญ่แล้ว การกลายพันธุ์มีผลกระทบต่อโปรตีนหลักในร่างกาย ซึ่งเรียกกันว่า C1 esterase inhibitor (C1-INH) โปรตีนชนิดนี้ มีหน้าที่ในการควบคุมอาการบวมในร่างกาย

HAE ชนิดที่ 1

อยู่ในประชากรธรรมดาทั่วไป ซึ่งคิดเป็น 85%ของผู้ป่วยด้วยโรค HAE ผู้ที่เป็น HAE ชนิดที่ 1 คือร่างกายไม่สามารถผลิต C1-INH ได้เพียงพอ

HAE ชนิดที่ 2

ประมาณ 15% ของคนที่เป็นโรค HAE จะเป็น ชนิดที่ 2 ในกรณีนี้ ผู้ป่วยจะมี C1-INH เพียงพอ แต่กลับไม่ได้ทำงานในแบบที่ควรจะเป็น

HAE ชนิดอื่น ๆ

ผู้ป่วยบางราย มีปริมาณและการทำงานของ C1-INH ที่ปกติ ซึ่งก่อนหน้านี้เรียกว่า HAE ชนิดที่ 3

ในปัจจุบัน นักวิจัยค้นพบว่าผู้ป่วยในกรณีแบบนี้มากขึ้น ซึ่งการกลายพันธุ์ของยีนแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุของ HAE ที่ <https://th.knowhae.com/> และควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางว่าคุณเป็น HAE ชนิดไหน



This information is available to the public for information purposes only; it should not be used for diagnosing or treating a health problem or disease. It is not intended to substitute for consultation with a healthcare provider. Please consult your healthcare provider for further advice. Copyright © 2025 Takeda (Thailand), Ltd. Takeda and the Takeda Logo are registered trademarks of Takeda Pharmaceutical Company Limited. All rights reserved. C-ANPROM/TH/FIR/0099: May 2025